

Quadro 2: Porcentagem de incidência de ferrugem (f), cercóspora (c) e phoma (p) em cultivares de café arábica. Brejetuba, ES, 2010 a 2011

Cultivares	Ano 2010																					Ano 2011		
	Veranico			jul			ago			set			out			nov			dez			jan		
	F	C	P	F	C	P	F	C	P	F	C	P	F	C	P	F	C	P	F	C	P	F	C	P
Iapar 59	0	7	10	0	3	20	1	18	9	0	15	12	0	12	8	0	2	2	0	20	6	0	30	5
Rubi	0	3	4	0	7	8	0	12	10	0	7	7	0	6	7	0	0	0	0	14	2	0	20	3
Acauã	0	1	4	0	7	5	0	17	2	0	8	6	0	11	7	0	1	1	0	11	2	0	20	0
Paraíso	0	4	4	0	8	3	0	5	2	0	4	7	0	8	2	0	0	0	0	14	0	0	22	0
Catucaí 2SL	0	2	4	0	8	9	0	9	7	0	8	6	0	4	4	0	1	2	0	12	1	0	12	2
Catucaí 99	0	7	4	1	10	15	1	7	8	1	10	9	1	14	6	1	3	1	0	25	3	0	30	5
Catucaí 785-15	0	6	4	0	8	8	0	14	4	0	12	9	0	12	6	0	2	1	0	16	0	0	25	2
Catucaí 39	0	1	3	0	8	7	0	20	5	0	6	8	0	7	2	0	0	0	0	25	3	0	25	3
Cultivares	Ano 2011																							
	fev			mar			abr			maí			jun			jul			ago			set		
	F	C	P	F	C	P	F	C	P	F	C	P	F	C	P	F	C	P	F	C	P	F	C	P
Iapar 59	0	16	0	0	18	4	0	20	2	0	32	0	0	22	4	0	30	5	0	25	3	0	15	2
Rubi	0	13	2	0	8	0	0	18	1	1	18	3	1	10	4	9	18	2	9	15	1	4	8	0
Acauã	0	12	1	0	6	1	1	10	2	0	8	2	0	8	2	0	11	0	0	10	0	0	4	0
Paraíso	0	16	0	0	5	0	0	5	6	0	7	1	0	6	2	0	14	2	0	12	1	0	3	1
Catucaí 2SL	0	0	1	1	6	1	2	8	0	0	14	1	0	48	1	0	21	2	0	18	1	0	6	1
Catucaí 99	0	13	2	2	10	4	3	18	3	10	13	3	1	13	2	2	20	4	1	15	2	9	6	1
Catucaí 785-15	0	12	3	0	6	0	0	10	2	0	11	1	0	21	0	0	8	0	0	10	0	3	12	0
Catucaí 39	0	11	1	2	8	2	0	12	2	2	18	1	4	28	0	15	18	1	12	12	0	9	2	0

O veranico apresentou importante influência na infestação de bicho mineiro, atingindo nível de dano econômico e necessitando de intervenção para controle; a incidência de ferrugem, cercóspora e phoma necessitam ser monitoradas nas cultivares avaliadas para a adoção de medidas de controle; a cercóspora pode representar problema para cultivo comercial das cultivares testadas.